




















VIVERO MUNICIPAL DE PLANTAS AUTOCTONAS. SAN ISIDRO										Exposición		Riego		Propagación		
 NOMBRE COMUN : Algodonillo NOMBRE CIENTIFICO : <i>Aeschynomene montevidensis</i> FAMILIA : Leguminosas DISTRIBUCION : Brasil, Paraguay, Uruguay y N.E. de Argentina										 						
FOLLAJE		FLORACION		FRUCTIFICACION												
<ul style="list-style-type: none"> - Hojas alternas, compuestas, de 7 cm de largo, con 15 - 18 pares de folíolos de punta redondeada, muy próximos entre sí - Follaje persistente 		<ul style="list-style-type: none"> - Inflorescencias en racimos axilares poco ramificados - Flores hermafroditas, de 1,5 a 2,5 cm de largo, amarillo-anaranjadas con estandarte y quilla 		<ul style="list-style-type: none"> - Legumbre recta, de 5 - 8 cm, transversalmente tabicada entre las semillas - Al madurar se separan segmentos que contienen una semilla oscura de forma arriñonada 												
																
OBSERVACIONES																
<ul style="list-style-type: none"> - Arbusto de forma globosa o elíptica de 2 - 3 m de altura, muy ramificado, leñoso en la base, frecuente en bordes de ríos de la mesopotamia y el delta, donde crece en terrenos inundables o muy húmedos, formando parte del matorral ribereño - Es polinizado por abejorros (género <i>Bombus</i>) y sus semillas dispersadas por el agua - De crecimiento rápido, es adecuado para agregar color en zonas húmedas. Su follaje poco denso y de fina textura forma una pantalla etérea, casi transparente 																
COMPORTAMIENTO A LO LARGO DEL AÑO																
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
Foliación																
Floración																
Fructificación	