VIVERO MUNICIPAL DE PLANTAS AUTOCTONAS. SAN ISIDRO

NOMBRE COMUN : **Flor de nácar. Begonia**

NOMBRE CIENTIFICO : ***Begonia cucullata*** FAMILIA : **Begoniáceas**

DISTRIBUCION :**en Argentina, desde Misiones hasta la ribera del Plata**

Exposición | Riego | Propagación

FOLLAJE

- Hojas alternas, simples, asimétricas, con borde ondulado, de hasta 10 cm de largo y 8 cm de ancho
- Color verde brillante, algo carnosas

FLORACION

- Son plantas monoicas: un mismo individuo tiene flores masculinas y femeninas
- Flores masculinas con 2 tépalos mayores ligeramente rosados, y 2 tépalos menores y blancos; numerosos estambres amarillos
- Flores femeninas con 4 tépalos libres y ovario ubicado por debajo con 3 cavidades (lóculos)

FRUCTIFICACION

- Cápsula trialada, de 2,5 a 3 cm de largo, con un ala triangular más grande y dos más pequeñas; péndula a la madurez



OBSERVACIONES

- Hierba perenne, estolonífera, erecta, con tallos suculentos algo rojizos, de 0,1 a 1 metro de altura. Crece en lugares húmedos y sombríos, zanjas y pajonales próximos a cursos de agua
- Ornamental, apta para macizos, bordes y canteros, en rincones ligeramente sombreados del jardín
- Se reproduce por semillas y se multiplica por gajos
- Tiene propiedades medicinales y sus hojas son comestibles

COMPORTAMIENTO ANUAL

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Foliación	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Floración	■	■									■	■
Fructificación	■	■	■									■