



VIVERO MUNICIPAL DE PLANTAS AUTOCTONAS. SAN ISIDRO

NOMBRE COMUN : **Lirio del bajo**

NOMBRE CIENTIFICO : ***Cypella herbertii***

FAMILIA : **Iridáceas**

DISTRIBUCION : **S. de Brasil, Paraguay, Uruguay y N.E. de Argentina**

Exposición






Riego



Propagación



FOLLAJE	FLORACION	FRUCTIFICACION
<p>- Hojas basales lineales, flácidas, de 15 a 45 cm de largo y 0,5 a 2 cm de ancho</p> 	<p>- Flores amarillo-anaranjadas, de 6 - 7 cm de diámetro; efímeras (duran un día)</p> <p>- Tépalos: 3 externos y 3 internos de diferente conformación y tamaño</p> 	<p>- Cápsula claviforme de 1,5 a 2 cm de largo</p> <p>- Numerosas semillas pardo-ocráceas</p> 



OBSERVACIONES

- Hierba monocotiledónea de 30 a 100 cm de altura, bulbosa, cuya parte aérea desaparece durante los meses fríos. Las yemas de renuevo permanecen bajo tierra durante ese periodo
- Ornamental: apta para macetas y canteros. Se multiplica por bulbos
- Requiere sol y suelos bien drenados
- Polinización por insectos (abejas y coleópteros)



COMPORTAMIENTO ANUAL

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Foliación	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Floración									■	■	■	■
Fructificación									■	■	■	■