VIVERO MUNICIPAL DE PLANTAS AUTOCTONAS. SAN ISIDRO

NOMBRE COMUN : **Timbó. Pacará. Cambá-nambí. Oreja de negro**

NOMBRE CIENTIFICO : ***Enterolobium contortisiliquum*** FAMILIA : **Leguminosas**

DISTRIBUCION : **En Argentina N.O. (Selva de las Yungas) y N.E. (Selva paranaense)**

Exposición | Riego | Propagación

FOLLAJE

- Copa en forma de sombrilla
- Hojas compuestas, bipinadas, de 15 a 25 cm de largo con 4 a 7 pares de pinnas cada una con 11 a 21 pares de foliolos verde claro el haz y grisáceo el envés de 1 a 2 cm de largo

FLORACION

- Flores hermafroditas pequeñas, con estambres sobresalientes, blanco-verdosas, de 1 a 1,5 cm de largo, dispuestas en inflorescencias hemiesféricas en racimos axilares y apicales

FRUCTIFICACION

- Legumbre chata de forma arriñonada, de color castaño a negro, lisa, de 5 a 9 cm de diámetro
- Semillas ovales de 1 cm de longitud

TRONCO

- Recto, de largo fuste, y diámetro de hasta 1,6 m de diámetro
- Corteza grisácea con lenticelas oscuras, lisa en los jóvenes



OBSERVACIONES

- Árbol robusto, de porte majestuoso, que puede llegar a los 40 m de altura. Copa amplia, ramificación extendida e inerme y follaje caduco en invierno. Los frutos, que persisten en las ramas en el invierno, son muy livianos y flotan en agua, lo que facilita la dispersión de la especie a lo largo de los ríos
- Especie poco exigente, prefiere suelos húmedos y clima cálido
- Ornamental: por su porte y por proveer buena sombra, adecuado para grandes espacios en parques y avenidas

COMPORTAMIENTO ANUAL

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Foliación	■	■	■	■	■	■				■	■	■
Floración	■									■	■	
Fructificación	■	■	■	■								