



VIVERO MUNICIPAL DE PLANTAS AUTOCTONAS. SAN ISIDRO

NOMBRE COMUN : Ceibo. Seibo. Suiñandí

NOMBRE CIENTIFICO : *Erythrina crista-galli*

FAMILIA : Leguminosas

DISTRIBUCION : S. de Brasil, Paraguay, Uruguay. N. y N.E. de Argentina

Exposición







Riego



Propagación



FOLLAJE	FLORACION	FRUCTIFICACION	TRONCO
<ul style="list-style-type: none"> - Hojas alternas, compuestas, cuyas láminas están formadas por tres folíolos de 6 a 14 cm de largo - Agujones curvos en los pecíolos y en la nervadura media de los folíolos 	<ul style="list-style-type: none"> - Inflorescencias en racimos terminales péndulos - Flores rojas, carnosas, con un estandarte elíptico y una quilla en forma de gancho por cuyo extremo asoman los estambres 	<ul style="list-style-type: none"> - Legumbre curvada, comprimida entre las semillas, castaño oscura en la madurez, de 10 a 30 cm de largo - Semillas oscuras de forma arriñonada 	<ul style="list-style-type: none"> - Tronco corto, hasta de 1 m de diámetro - Corteza gruesa, corchosa, con profundos surcos longitudinales y transversales
			



OBSERVACIONES

- Árbol de 5 - 10 m de altura, habitante característico de bordes de ríos y arroyos de la mesopotamia y el delta, donde crece en terrenos inundables formando parte de bosques y selvas marginales o como montes puros (*ceibales*) en las islas del delta
- Copa irregular y rala, con ramas tortuosas provistas de agujones. Corteza ideal para la instalación de epífitas. Follaje caedizo. Floración espectacular.
- Apto para jardines amplios, parques y plazas. Puede cultivarse en macetas durante los primeros años

COMPORTAMIENTO A LO LARGO DEL AÑO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Foliación	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Floración				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fructificación				■	■	■	■	■	■	■	■	■

