



### VIVERO MUNICIPAL DE PLANTAS AUTOCTONAS. SAN ISIDRO

NOMBRE COMUN : **Camará morado. Lantana morada**

NOMBRE CIENTIFICO : ***Lantana megapotamica***

FAMILIA : **Verbenáceas**

DISTRIBUCION : **Paraguay, S. de Brasil, Uruguay, centro y NE. de Argentina**

Exposición



Riego



Propagación



FOLLAJE	FLORACION	FRUCTIFICACION
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tallos rígidos, cuadrangulares, de 1 a 2 m de largo</li> <li>- Hojas opuestas, ovadas, con el extremo aguzado, borde aserrado, ásperas, de 2-4 cm de largo y 1-2 cm de ancho, que emiten un olor característico al manipularlas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inflorescencias en cabezuelas globosas y flores violáceas con centro blanco y garganta amarilla</li> <li>- Polinizadas por insectos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Drupas esféricas, de 4-5 mm de diámetro, de color violáceo a negrozco</li> <li>- Dispersión por animales, que se alimentan de ellas</li> </ul>



### OBSERVACIONES

- Arbusto apoyante, de 40 - 50 cm de altura, que se propaga por el terreno emitiendo ramas que se van enraizando al tocar el suelo su extremo. Follaje caduco
- Crece en terrenos modificados, borde de caminos y en el interior de bosques. Frecuente en las barrancas de los ríos Paraná y Uruguay
- Se multiplica por semillas y se reproduce por estacas y acodos espontáneos
- Ornamental: por su delicada y densa floración. Apta para atraer mariposas al jardín. Puede usarse como cubresuelos y también como planta colgante. Prefiere suelos secos y se da bien tanto al sol como a media sombra



### COMPORTAMIENTO ANUAL

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Foliación	[Pattern indicating leaf presence throughout the year]											
Floración	[Pattern indicating flowering from March to October]											
Fructificación	[Pattern indicating fruiting from April to November]											