

	<b>VIVERO MUNICIPAL DE PLANTAS AUTOCTONAS. SAN ISIDRO</b>		Exposición	Riego	Propagación
	NOMBRE COMUN : Pavonia, guaichí		 		
	NOMBRE CIENTIFICO : <i>Pavonia hastata</i>	FAMILIA : <b>Malváceas</b>			
DISTRIBUCION : <b>Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y N.E. de Argentina</b>					

FOLLAJE	FLORACION	FRUCTIFICACION
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hojas alternas, con forma de punta de lanza, de base ancha y ápice agudo, de 3 a 6 cm de largo. Bordes aserrados</li> <li>- Haz verde oscuro opaco y envés verde ceniciento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flores hermafroditas, de 5 a 7 cm de diámetro, solitarias y axilares</li> <li>- 5 pétalos rosados con venas y base púrpura. Del centro emerge un pistilo morado rodeado de estambres amarillos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fruto redondeado, de 5 - 8 mm de diámetro, que contiene semillas oscuras de forma arriñonada</li> </ul>



### OBSERVACIONES

- Arbusto de forma globosa irregular de 1 - 2 m de altura, con ramificaciones delgadas ascendentes, de follaje persistente poco denso, que crece en campos abiertos, terraplenes, barrancas, arenales y bosques húmedos. De crecimiento lento, acepta podas, es polinizado por insectos y se reproduce por semillas y multiplica por estacas
- En primavera se produce una floración cerrada mediante la cual la flor se autopoliniza (cleistogamia), garantizando así su reproducción
- El atractivo de su follaje y floración la hace adecuada para cercos y alambrados así como para contrastar con otros follajes

### COMPORTAMIENTO A LO LARGO DEL AÑO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Foliación	[Pattern]											
Floración	[Pattern]											
Fructificación	[Pattern]											

