



VIVERO MUNICIPAL DE PLANTAS AUTOCTONAS. SAN ISIDRO

NOMBRE COMUN : **Flor de pitito**

NOMBRE CIENTIFICO : ***Tropaeolum pentaphyllum*** FAMILIA : **Tropeoláceas**

DISTRIBUCION : **Bolivia, Paraguay, S. de Brasil, Uruguay y NE. de Argentina**

Exposición



Riego



Propagación



FOLLAJE	FLORACION	FRUCTIFICACION
<ul style="list-style-type: none"> - Tallos delgados, rojizos - Hojas alternas, de aproximadamente 5 cm de diámetro, palmadas, con segmentos elípticos de ápice agudo - Pecíolos largos que actúan como zarcillos, sujetando la planta a su sostén 	<ul style="list-style-type: none"> - Flores solitarias, con 5 sépalos prolongados hacia atrás en un capuchón cónico, nectarífero, de color rojo - Pétalos rojos y pequeños - Polinizada por picaflores 	<ul style="list-style-type: none"> - Tres bayas esféricas, carnosas, unidas entre sí, de color verdoso que se torna azul-violáceo en la madurez, cada una conteniendo una semilla - Dispersión por aves, que se alimentan de ellas



OBSERVACIONES

- Enredadera perenne de crecimiento rápido, cuya parte aérea brota a principios de otoño a partir de tubérculos subterráneos, florece a fines de invierno y muere tras la fructificación a comienzos del verano
- Propia de bosques húmedos, borde de caminos y alambrados
- Su estado de conservación está categorizado como *vulnerable* por pérdida de su hábitat
- Ornamental: por su porte delicado y sus llamativas flores es apta para cercos y enrejados en jardines aunque también para macetas



COMPORTAMIENTO ANUAL

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Foliación				✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Floración							✕	✕	✕	✕	✕	
Fructificación									✕	✕	✕	✕