



VIVERO MUNICIPAL DE PLANTAS AUTOCTONAS. SAN ISIDRO

NOMBRE COMUN : **Azucenita del campo**
 NOMBRE CIENTIFICO : **Zephyranthes candida** FAMILIA : **Amarilidáceas**
 DISTRIBUCION : **Uruguay y NE de Argentina. Delta y ribera del Plata**


Exposición



Riego



Propagación



FOLLAJE	FLORACION	FRUCTIFICACION	BULBO
<ul style="list-style-type: none"> - Hojas basales, lineares y cilíndricas, poco numerosas, sésiles, de 20 a 30 cm de largo - Color verde vivo 	<ul style="list-style-type: none"> - Al finalizar el verano - Flores únicas en cada tallo (escapo), blancas, de color muy puro, inodoras - Base verdosa que contrasta con las anteras amarillas 	<ul style="list-style-type: none"> - Al comenzar el otoño - Cápsula subglobosa, trilobulada, de 1,5 cm de ancho - Semillas negras 	<ul style="list-style-type: none"> - Bulbos ovoideos de 2 - 3 cm de diámetro - En zonas frías, durante el descanso vegetativo, los bulbos pueden retirarse y conservarse en lugar oscuro, seco y fresco 



OBSERVACIONES

- Monocotiledónea. Hierba bulbosa de 10 - 30 cm de altura, que crece en suelos húmedos, frecuente en céspedes ribereños
- Ornamental, ideal para bordes de estanques. También adecuado para terraplenes, macetas y canteros.
- Propagación por división de los bulbos en otoño o por semillas
- La parte aérea puede decaer durante los meses fríos y rebrotar en primavera

SUELO

- Necesita suelo ligero, levemente húmedo, y con buen drenaje
- Una mezcla adecuada de sustrato puede contener tierra, mantillo de hojas y arena
- Tolera suelos encharcados

COMPORTAMIENTO ANUAL

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Foliación	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Floración		■	■	■	■							
Fructificación			■	■	■	■						

